

Antiséptico y Descongestivo Ocular

**COMPOSICIÓN.-** Cada ml contiene 5 mcg de metiltionina cloruro y 0,25 mg de nafazolina clorhidrato.

Excipientes: cloruro de benzalconio, cloruro sódico, fosfato disódico, fosfato monosódico y agua purificada.

**PROPIEDADES.-** CENTILUX asocia la acción antiséptica de la metiltionina (azul de metileno) con la acción vasoconstrictora y descongestiva de la nafazolina.

**INDICACIONES.-** Alivio temporal sintomático de la congestión e irritaciones oculares leves como en el caso de ojos lagrimosos y enrojecidos por causa de luz solar, humo, polvo, contaminación, ambientes secos, trabajo en lugares cerrados, conducción de automóviles.

**POSOLOGÍA.-** Se instilarán de 1 a 2 gotas en cada ojo de 2 a 4 veces al día.  
Niños: Consultar al médico.

**RECOMENDACIONES PARA EL EMPLEO DE COLIRIOS.-** Por tratarse de especialidades estériles, se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Cada paciente utilizará su propio envase.
- La aplicación del colirio deberá realizarse con la máxima pulcritud, evitando en lo posible cualquier contacto con el goteador.
- Después de cada aplicación, cerrar bien el envase.
- Finalizado el uso establecido deberá desecharse el resto del preparado aunque no se haya consumido en su totalidad.
- Desechar al mes de abierto el envase.

**NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN.-** Con la cabeza inclinada hacia atrás, separar hacia abajo el párpado inferior e instilar las gotas en el saco conjuntival ( espacio entre el ojo y el párpado ) mientras se dirige la mirada hacia arriba. Cerrar los ojos suavemente y mantenerlos cerrados durante algunos instantes.

Antes de usar otras medicaciones oftálmicas, esperar como mínimo 5 minutos.

**PRECAUCIONES.-** Hipersensibilidad a otros descongestivos oculares.

No utilizarlo si la solución cambia de color o se enturbia.

Las personas con presión arterial elevada, hipertiroidismo, enfermedades del corazón, enfermedades o lesiones oculares y diabetes deben usar con precaución este medicamento.

**ADVERTENCIAS.-** Si con el uso de este producto se produce dolor o cambios en la visión o persiste el enrojecimiento o la irritación ocular, o bien si la sintomatología empeora o dura más de 72 horas, dejar de utilizar el medicamento y consultar al médico.

**Advertencia sobre excipientes:**

Este medicamento, por contener cloruro de benzalconio como excipiente puede decolorar las lentes de contacto blandas. Si utiliza lentes de contacto, deberá retirarlas antes de la aplicación del producto y esperar de 10 a 15 minutos antes de volver a colocarse las lentes.

**CONTRAINDICACIONES.-** No utilizar este preparado si el paciente es hipersensible a los componentes de la fórmula o bien ha sido diagnosticado de glaucoma de ángulo estrecho.

**EFFECTOS SECUNDARIOS.-** A las dosis recomendadas y durante períodos cortos de tiempo este medicamento no suele producir efectos secundarios. En ocasiones, se ha observado picor o sensación de quemazón, dilatación de la pupila, aumento de la presión intraocular y efectos de carácter general debidos a la absorción.

**INCOMPATIBILIDADES.-** No utilizar este preparado si se está bajo tratamiento con antidepresivos tricíclicos y maprotilina.

**INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO.-** A las dosis indicadas no son de esperar fenómenos de intoxicación con el uso de la especialidad. En caso de sobredosis o ingestión accidental del contenido de un envase, especialmente en niños, pueden aparecer signos de afectación del SNC que requerirán tratamiento sintomático. En estos casos consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.-** Proteger de la luz y del calor.

**PRESENTACIÓN.-** Envase con 10 ml.  
Sin receta médica.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA  
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

ALCON CUSÍ, S.A.  
c/ Camil Fabra, 58  
08320 El Masnou - Barcelona