

## **Prospecto: información para el usuario**

### **IMONOGAS 120 mg cápsulas blandas** Simeticona

#### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento porque contiene información importante para usted**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 10 días de tratamiento.

#### **Contenido del prospecto:**

1. Qué es IMONOGAS y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar IMONOGAS
3. Cómo tomar IMONOGAS
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de IMONOGAS
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. Qué es IMONOGAS y para qué se utiliza**

Este medicamento actúa rompiendo los gases atrapados que causan hinchazón.

Esta indicado para el tratamiento sintomático de los gases (flatulencia) en adultos.

Debe consultar a un médico si empeora o no mejora después de 10 días.

#### **2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar Imonogas**

#### **No tome IMONOGAS**

- si es alérgico a la simeticona o a cualquiera de los demás componentes de Imonogas (incluidos en la sección 6).

#### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico si:

- no mejora después de 10 días de tratamiento
- tiene estreñimiento prolongado

#### **Niños y adolescentes**

No utilizar en niños y adolescentes menores de 18 años.

#### **Toma de Imonogas con otros medicamentos**

Comunique a su médico o farmacéutico que está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Aunque este medicamento no se absorbe, no se recomienda su uso en embarazadas.

Este medicamento puede ser utilizado durante la lactancia, ya que la simeticona no se excreta por la leche materna.

### **Conducción y uso de máquinas**

Este medicamento no tiene influencia sobre la capacidad para conducir o usar máquinas.

### **3. Cómo tomar Imonogas**

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada en adultos es de 1 cápsula, después de cada una de las principales comidas.

### **Uso en niños y adolescentes**

Este medicamento está indicado sólo para adultos. Los niños y adolescentes menores de 18 años no lo deben tomar.

Este medicamento se toma por vía oral.

Ingiera la cápsula con una cantidad suficiente de líquido, preferentemente un vaso de agua, nunca con zumo de pomelo o leche.

No tomar más de 4 cápsulas (500 mg) al día.

Si después de 10 días de tratamiento no mejora o empeora, debe suspenderlo y consultar al médico.

### **Si toma más Imonogas del que debiera**

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte a su médico o farmacéutico, o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20 (indicando el medicamento y la cantidad ingerida).

### **Si olvidó tomar Imonogas**

Tome 1 cápsula después de la siguiente comida principal. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, Imonogas puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren.

Durante el periodo de utilización de la simeticona se han observado los siguientes efectos adversos cuya frecuencia no se ha podido establecer con exactitud:

- Reacciones alérgicas, tales como erupción cutánea, picor, hinchazón de cara y lengua o dificultad para respirar.
- Náuseas, estreñimiento, vómitos.


Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

#### **5. Conservación de Imonogas**

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el blister o el envase después de “Caducidad”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Los medicamentos no se deben de tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto Sigre  de la farmacia. En caso de duda, pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudara a proteger el medio ambiente.

#### **6. Contenido del envase e información adicional**

##### **Composición de Imonogas**

El principio activo es Simeticona. Cada cápsula contiene 120 mg de simeticona. Los demás componentes (excipientes) son: gelatina y glicerol (E- 422).

##### **Aspecto del producto y contenido del envase**

Imonogas es una cápsula blanda de gelatina transparente. Cada envase contiene 20, 40 cápsulas.

##### **Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación**

###### **Titular de la autorización**

Johnson & Johnson S.A.  
Paseo Doce Estrellas, 5-7  
28042-Madrid. España

###### **Responsable de la fabricación**

Catalent France Beinheim S.A., 74 rue Principale.  
67930 Beinheim, Francia

**Fecha de la última revisión de este prospecto: Marzo 2013**

### **Consejos de Educación Sanitaria**

¿Qué hacer si usted tiene problemas digestivos?

#### **Indigestión:**

Puede tener problemas si usted:

Come demasiado

Come comidas ricas en grasas

Come demasiado rápido, sin masticar

Bebe demasiado alcohol con las comidas

Trate de evitar estos desencadenantes.

#### **Gases (flatulencia):**

Con algunas comidas es más probable la aparición de gases porque:

Contienen aire por sí mismas (por ejemplo bebidas gaseosas, pan fresco)

Contienen altos niveles de carbohidratos los cuales no se absorben (por ejemplo, verduras secas, repollo, verduras crudas, cebollas). Trate de evitar estas comidas.

Consulte a su médico o farmacéutico si necesita más información.

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>.