

Prospecto: información para el usuario

Lipolac 2 mg/g gel oftálmico Carbómero

Lea todo el prospecto detenidamente porque contiene información importante para usted.

Este medicamento puede adquirirse sin receta. No obstante, para obtener los mejores resultados, debe utilizarse con cuidado.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si los síntomas empeoran o persisten, debe consultar un oftalmólogo.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto

1. Qué es Lipolac y para qué se utiliza
2. Antes de usar Lipolac
3. Cómo usar Lipolac
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Lipolac
6. Información adicional

1. Qué es Lipolac y para qué se utiliza

Lipolac es un gel altamente viscoso blanquecino que contiene un lubricante que se utiliza como un sustituto de las lágrimas naturales. Sus ojos normalmente producen las suficientes lágrimas naturales para poderse mover con facilidad y comodidad. Si sus ojos no producen suficientes lágrimas pueden llegar a secarse, a enrojecerse y a doler. Lipolac le ayudará a mantener sus ojos sin molestias.

Lipolac es un gel altamente viscoso que forma una capa protectora sobre el ojo y mantiene su superficie húmeda.

Es fácil y cómodo de usar, y es especialmente apropiado en el tratamiento sintomático del ojo seco grave.

2. Antes de usar Lipolac

No use Lipolac

No utilice Lipolac si usted es alérgico (hipersensible) al carbómero o a cualquiera de los demás componentes de Lipolac. En la sección de “Composición de Lipolac” vienen descritos todos los componentes de Lipolac.

Uso de otros medicamentos

Cuando Lipolac se usa al mismo tiempo que otros colirios o cremas oculares, debe dejarse un intervalo de tiempo de aplicación de aproximadamente 15 minutos entre el uso de estos otros medicamentos y Lipolac, que debe ser siempre la última medicación que se ponga.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento.

Es posible que a usted se le recomiende este medicamento, pero también es posible que pueda utilizar una alternativa.

Conducción y uso de máquinas

Al igual que con todas las preparaciones para los ojos, usted puede tener la visión borrosa durante un corto período de tiempo, después de ponerse el gel. Espere hasta que su vista está clara antes de conducir o utilizar máquinas.

Lentes de contacto

Con el fin de evitar rayas o grumos de gel en las lentes de contacto, debe retirarlas antes de la aplicación de Lipolac. A los 30 minutos puede volver a ponérselas.


3. Cómo usar Lipolac

Siga exactamente las instrucciones de administración de Lipolac indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

La dosis normal es ponerse una gota en el ángulo del ojo más cercano a la nariz, 3-5 veces al día, y aproximadamente 30 minutos antes de acostarse.

Siga estas instrucciones con atención:

1. Lávese bien las manos.
2. Desenrosque el tapón.
3. Mire hacia arriba y suavemente tire hacia abajo el párpado inferior.
4. Sostenga el tubo de Lipolac justo por encima de su ojo y apriete suavemente hasta que caiga gel en el hueco entre el globo ocular y el párpado inferior.
5. Suelte el párpado inferior, y mueva el ojo mientras esté abierto para asegurar que el gel cubre completamente el ojo.
6. Repita el proceso en el otro ojo, si es necesario.



Uso en niños

No hay datos disponibles. No hay un uso relevante de Lipolac en niños entre 10-18 años, para la indicación de ojo seco.

Si usa más Lipolac del que debiera

Si se ha puesto demasiado Lipolac, enjuague el gel de sus ojos.

Si olvidó usar Lipolac

No se aplique una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con Lipolac

El trastorno de la sequedad ocular puede empeorar si se trata de forma incorrecta o inadecuada.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Como todos los medicamentos, Lipolac puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Sus ojos le pueden doler un poco cuando se ponga el gel y su visión puede volverse borrosa. Estos efectos desaparecerán en pocos minutos.

Se han recibido algunos informes de alergias (hipersensibilidad) después de la administración de Lipolac, debido a uno de los excipientes de la composición. Otros efectos adversos que raramente han sido informados son párpados pegajosos, conjuntivitis (ojos enrojecidos), moteado (o puntos) en la córnea (la superficie del ojo), ojos hinchados, ardor, picazón e irritación del ojo.

Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

5. Conservación de Lipolac

No utilice Lipolac después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de CAD. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

No conservar a temperatura superior a 25°C (temperatura ambiente)


Lipolac es estéril hasta que se abre el tubo por primera vez. Es importante mantener el tubo tan limpio como sea posible durante su uso.

El tubo tiene una tapa plana, lo que le permite estar en una posición vertical.

Deseche el contenido restante 28 días después de la apertura del tubo. Puede ser útil escribir en el tubo la fecha en la que se abrió por primera vez.

Manténgase fuera del alcance y la vista de los niños.

Recuerde que este medicamento es para usted. No se lo dé a otra persona.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Información adicional

Composición de Lipolac

El principio activo es carbómero. Cada tubo contiene 2,0 mg de carbómero por g de gel. Los demás componentes son cetrimida, sorbitol, triglicéridos de cadena media, hidróxido sódico (para ajuste de pH) y agua purificada.

Lipolac gel oftálmico contiene el conservante cetrimida.

Aspecto del producto y contenido del envase

Lipolac gel oftálmico es un gel blanquecino altamente viscoso.

Cada tubo contiene 10 g de gel oftálmico. Este medicamento se presenta en cajas conteniendo 1 ó 3 tubos de 10 g de gel oftálmico.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envase.

Titular de la autorización de comercialización y responsable de fabricación

Titular

Angelini Farmacéutica, S.A.
C. Osi, 7 - 08034 Barcelona (España)
Tel. +34 932 534 500

Responsable de fabricación

Dr. Gerhard Mann
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbuttel Dam 165-173

13581 Berlin (Alemania)
Tel. +49 30 33093-170
Fax +49 30 33093-473

Este medicamento está autorizado en los Estados Miembros del Espacio Económico Europeo con los siguiente nombres:

Reino Unido	Liposic Eye Gel
Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda	Liposic
Italia	Lipovisc
España	Lipolac

Este prospecto ha sido aprobado en septiembre 2010

La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>