

LUPIDON

COMPRIMIDOS.

FÓRMULA POR

Poligalacturonato de magnesio
Pantotenato cálcico
Dimeticona
Excipientes

Comprimido

100 mg
100 mg
15 mg
Lactosa, Almidón, Sílice coloidal, Talco, Estearato de magnesio, Dióxido de titanio, Eudragit

FORMA FARMACÉUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE.

Comprimidos: Envase con 30 y 60

ACTIVIDAD.

Tratamiento completo de los meteorismos. Elimina el exceso de gases y protege las mucosas digestivas.

TITULAR Y FABRICANTE

SEID, S.A.

Crta de Sabadell a Granollers, Km 15
08185 LLIÇA DE VALL (Barcelona)

INDICACIONES.

Meteorismo. Flatulencias. Digestiones difíciles. Aerocolia. Aerogastria. Dispepsia de fermentación. Gastritis. Úlcera gastroduodenal. Colon irritable. Enterocolitis crónica, etc.

DOSIS

1 a 3 comprimidos 3 veces al día, antes, durante, o después de las comidas.

También puede tomarse, cuando aparecen los síntomas.

CONTRAINDICACIONES.

No se conocen.

INTERACCIONES.

No simultanear el tratamiento con otro a base de tetraciclinas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

No se conocen.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO.

Esta especialidad contiene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente en el preparado no es, probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas debe consultar a su médico.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MAQUINARIA.

No influye.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se han descrito efectos teratógenos.

INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO.

Dado el contenido del envase y la naturaleza de los principios activos, es totalmente imposible una intoxicación.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

CADUCIDAD.

No sobrepasar la fecha indicada en el envase.

Fecha de la última revisión del prospecto: Diciembre 1996.

Sin receta médica.

Los medicamentos deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños.