

# **PROSPECTO**

**MEDEBIOTIN FUERTE COMPRIMIDOS (BIOTINA)**



**Composición:**

Por comprimido:

Biotina (DCI) ..... 5 mg.

**Excipientes:**

Sílice coloidal, talco, almidón de maíz, polivinilpirrolidona, PEG 6000+4000, estearato de Mg, bicarbonato sódico, celulosa microcristalina y metilparabén.

**Forma farmacéutica y contenido del envase:**

Envase con 40 comprimidos.

**Actividad:**

La Biotina es necesaria para el funcionamiento adecuado de los enzimas que transportan las unidades carboxilo y fijan el Dióxido de Carbono. Es imprescindible para varias funciones metabólicas, incluyendo la gluconeogénesis, lipogénesis, biosíntesis de ácidos grasos, metabolismo del propionato y catabolismo de aminoácidos de cadena ramificada.

**Titular y fabricante:**

Titular:  
Laboratorios Medea, S.A.  
Gran Capitán 10  
08970 Sant Joan Despí Barcelona

Fabricante:  
Laboratorio Reig Jofre, S.A.  
Gran Capitán 10  
08970 Sant Joan Despí Barcelona

**Indicaciones:**

Tratamiento de los estados carenciales de Biotina o cuando existe un aumento de las necesidades de dicha vitamina.

La deficiencia de Biotina puede dar lugar a dermatitis y alopecia, entre otros trastornos.

Las necesidades de Biotina pueden estar incrementadas en afecciones como la dermatitis seborreica de la infancia.

**Contraindicaciones:**

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la especialidad.

**Precauciones:**

No se han descrito.





**Importante para la mujer:**

El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico. Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

**Interacciones e incompatibilidades:**

Existen indicios de que los fármacos anticonvulsivantes, tras largo tiempo de tratamiento, pueden reducir el nivel plasmático de la Biotina.

**Advertencias:**

- Embarazo y lactancia: No se han descrito problemas en humanos con la ingesta de las dosis recomendadas.
- Efectos sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinaria: no se han descrito.

**Posología:**

Uno o dos comprimidos al día por vía oral.

**Instrucciones para la correcta administración del preparado:**

Los comprimidos se ingerirán con un poco de líquido.

**Sobredosis:**

En el hombre no se han observado reacciones tóxicas a la Biotina, incluso a dosis muy elevadas.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

**Reacciones adversas:**

No se han descrito. Pero si se produce cualquier reacción adversa atribuible a la toma del medicamento consulte a su médico o farmacéutico.

**Conservación:**

Almacenar a temperatura ambiente.

**Caducidad:**

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.



**Otras Presentaciones:**

Medebiotin inyectables. 1 mg. Biotina/inj. Caja con 10 inyectables.

Medebiotin Fuerte inyectables. 5 mg. Biotina/inj. Caja con 10 inyectables.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

TEXTO REVISADO: DICIEMBRE 1996.