



## PROSPECTO

PUNTUAL



### Senósidos A + B sal cálcica

#### COMPOSICION

- **Senósidos A + B sal cálcica.....30 mg**
- **Glicerol c.s.p.....1 ml**

1 ml = 20 gotas

#### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

**Acción laxante.**

#### INDICACIONES

**Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional.**

#### POSOLOGIA Y MODO DE EMPLEO

**Adultos: dosis mínima.....8 gotas/día/toma**

**dosis media.....16 gotas/día/toma**

**dosis máxima.....24 gotas/día/toma**

**Niños de 6 a 12 años: .....4 a 8 gotas/día/toma**

Niños menores de 6 años consultar al médico.

Ingerir las gotas disolviéndolas en un poco de agua u otro líquido. Administrar preferentemente por la noche para conseguir el efecto deseado a la mañana siguiente.

#### CONTRAINDICACIONES

**Abdomen agudo, apendicitis**

**Dolor abdominal de origen desconocido, obstrucción intestinal, trastornos del balance electrolítico.**

**Alergia a alguno de sus componentes.**

#### INCOMPATIBILIDADES

Con glucósidos cardíacos. No debe tomarse al mismo tiempo que otros medicamentos, ya que puede alterar su absorción, distanciar su toma al menos 2 horas.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS

**Expulsión de gases precede a la evacuación normal. Ocasionalmente diarrea o dolor abdominal. Erupciones cutáneas.**

#### PRECAUCIONES

**No utilizar durante más de 6 días sin consultar al médico.**

#### ADVERTENCIAS

#### IMPORTANTE PARA LA MUJER

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**Las mujeres en periodo de lactancia deben consultar al médico antes de tomar este medicamento.**



**Puede aparecer una coloración rojiza en la orina debido a la eliminación del principio activo.**



**Advertencias sobre excipientes:**

Este medicamento por contener glicerol como excipiente puede ser perjudicial a dosis elevadas. Puede provocar dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea.

**INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO**

En caso de ingestión accidental o intencionada de 5-10 ml, en 3-4 horas aparecen evacuaciones blandas, diarrea y, a veces, vómitos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acudir a un centro médico o consultar al Servicio de Información Toxicológica, Tel: 91 5620420, indicando el producto y la cantidad ingerida.

**PRESENTACIÓN**

Frasco cuentagotas de 15 ml.

**LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

SIN RECETA MEDICA

LAINCO, S.A., Avda. Bizet, 8-12. 08191 RUBÍ (Barcelona).