

## **PROSPECTO TANAGEL COMPRIMIDOS**

Laboratorios Francisco Durbán, S.A.  
Polígono Ind, La Redonda, c/ IX, nº 75-76  
04710 El Ejido (Almería)

Vía Oral

### **PRESENTACIÓN**

Blister con 15 comprimidos

### **COMPOSICIÓN** (por comprimido)

Tanato de gelatina .....	500 mg
Extracto de opio .....	5,6 mg
Extracto de belladona .....	3,6 mg
Almidón .....	100 mg

### **INTRODUCCIÓN**

El Tanato de gelatina está admitido como el mejor antidiarreico tánico por asegurar la llegada al intestino de todo el tanino que entra en su composición, al pasar inalterable por el medio ácido del estomago, descomponiéndose en tanino y gelatina en el medio alcalino del intestino.

El tanino se combina con sustancias albuminoideas y mucilaginosas del contenido intestinal, neutralizando así muchos productos del catarro de las paredes enterocólicas, que a su vez habrían de obrar sobre la mucosa de las mismas, manteniendo su irritación en el círculo vicioso que, en este aspecto, constituye todo catarro intestinal,

Además la gelatina obra protegiendo mecánicamente la mucosa inflamada contra los ácidos y álcalis que las fermentaciones bacterianas o putrefacciones producen en el trayecto entérico.

En el **TANAGEL COMPRIMIDOS** la acción antidiarreica del Tanato de Gelatina está complementada por la acción del Extracto de opio, que actúa como analgésico y relajante de la musculatura de fibra lisa del intestino, disminuyendo su motilidad y del Extracto de belladona, por su acción antiespasmódica e inhibidora de las secreciones.

### **INDICACIONES**

Todas las diarreas del adulto, dispepsias, gastroenteritis, colitis, disentería, tuberculosis.

### **POSOLOGÍA**

De 4 a 6 comprimidos al día, pudiendo aumentarse de 10 a 15, por indicación facultativa

### **CONTRAINDICACIONES**

Estados convulsivos. Casos de insuficiencia renal y hepática, en fases terminales. Pancreatitis. Estenosis pilórica.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

#### **IMPORTANTE PARA LA MUJER**

Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo consulte a su médico antes de tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.

**EFFECTOS SECUNDARIOS**

Rara vez puede producirse sequedad en la boca y somnolencia..

**INCOMPATIBILIDADES**

No se han descrito

**ADVERTENCIA**

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico positivo en control de dopaje

**INTOXICACIÓN Y TRATAMIENTO**

No se han descrito cuadros de intoxicación con éste preparado.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN**

Las normales.

**Los medicamentos deben mantenerse fuera de la vista y del alcance de los niños**

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al  
SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
TELÉFONO 91 5620420