

VISADRON®

Hidrocloruro de fenilefrina

COMPOSICION

Cada ml contiene:

Hidrocloruro de fenilefrina (D.C.I.) 1,25 mg

Excipientes:

Acido bórico (E 240), bórax (E 241),
cloruro de benzalconio y agua para inyectables...c.s.

FORMA FARMACEUTICA Y CONTENIDO DEL ENVASE

Frasco con 10 ml de colirio

ACTIVIDAD

Descongestivo ocular

TITULAR Y FABRICANTE

Titular:

LABORATORIOS FHER, S.A.
Pablo Alcover, 31
08017 Barcelona

Fabricante:

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG
D-55216 Ingelheim am Rhein
Alemania

INDICACIONES

Alivio de la irritación ocular producida por humos, aire, polvo, cloro de las piscinas, agua de mar, ambientes cargados, lentillas, cosméticos, fatiga ocular, etc.

CONTRAINDICACIONES

Sólo excepcionalmente se ha observado una dilatación pupilar transitoria; por ello no debe utilizarse VISADRON en tipos de glaucoma en los que la dilatación pupilar puede ser perjudicial (glaucoma de ángulo estrecho).

No debe utilizarse en niños menores de tres años, ni en personas con una hipersensibilidad individual comprobada al producto.

PRECAUCIONES

Debe evitarse, como en todos los colirios, tocar el extremo del frasco con las manos o con otros objetos. Debe cerrarse inmediatamente después de utilizarlo.

INTERACCIONES

No se han descrito.

ADVERTENCIAS

Si no se ha producido mejoría al cabo de 72 horas de tratamiento o si se agravan los síntomas al aplicar el medicamento, debe consultarse al médico.

Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control del dopaje como positivo.

Advertencia sobre excipientes:

Por contener ácido bórico y bórax como excipientes, este medicamento está contraindicado en niños menores de tres años. Ver Contraindicaciones.

Por contener cloruro de benzalconio como excipiente, este medicamento puede decolorar las lentes de contacto blandas.

POSOLOGIA

Aplíquese en el saco conjuntival 1-3 gotas, varias veces al día.

Para portadores de lentillas de contacto duras, aplicar varias veces al día 2-3 gotas de VISADRON, sobre todo antes de colocar y después de quitar las lentillas.

No debe aplicarse más de 5 veces al día sin consultar al médico.

Modo de empleo

Preparar el frasco antes de usar VISADRON por primera vez.

1. Girar el tapón al máximo en el sentido de las agujas del reloj, para perforar el frasco (fig. 1).
2. Desenrosque el tapón girando hacia la izquierda (fig.2).
3. Con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y tirando suavemente del párpado inferior hacia abajo, dejar caer en el ojo 1-3 gotas de VISADRON (fig. 3).
4. Coloque siempre el tapón después del uso.

No utilizar el frasco más de cuatro semanas.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

SOBREDOSIFICACION Y TRATAMIENTO

No se han descrito casos de intoxicación. Si accidentalmente se ingiere por la boca, podría dar lugar a manifestaciones adrenérgicas (taquicardia, ansiedad, elevación de la presión arterial, etc.) que se tratarán con medidas sintomáticas. En estos casos, acuda a un centro médico indicando el producto y la cantidad ingerida.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

REACCIONES ADVERSAS

Si se usa con exceso, el propio medicamento puede provocar irritación ocular, por lo que debe seguirse estrictamente la dosificación indicada en el apartado "Posología".

CADUCIDAD

Este medicamento no se debe utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

En caso de que la solución cambie de color o se enturbie, no debe ser utilizada.

Texto revisado: Enero 2000

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

Sublicencia de Boehringer Ingelheim International GmbH